Restore Contact Layer Silver with TRIACT Technology,

Non-Adherent Dressing, Antimicrobial

DESCRIPTION

Restore Contact Layer Silver is a non-adhesive, non-occlusive, antimicrobial wound contact dressing, composed of a polyester mesh impregnated with a matrix comprising of hydrocolloid particles (carboxymethylcellulose), cohesion polymers, petrolatum and silver (2.25 mg/sq.inch).

INDICATIONS FOR USE

The barrier functions of **Restore Contact Layer Silver** may help reduce infection in low to moderate exuding partial and full thickness wounds, including second degree burns, pressure ulcers, venous stasis ulcers, diabetic ulcers and graft and donor sites.

MECHANISM OF ACTION

The proprietary TRIACT technology specificity lies in the presence of a polymer matrix which ensures cohesion of hydrocolloid particles and petrolatum on a polyester mesh.

In contact with wound exudates, the hydrocolloid particles combine with the matrix to form a lipido-colloidal gel, providing a moist environment that promotes healing. Being non-adhesive, removal of **Restore Contact Layer Silver** is virtually pain-free and helps minimize damage to newly formed surrounding skin. It is ideal for use on wounds with fragile surrounding skin.

Restore Contact Layer Silver was shown to be effective against bacteria most frequently associated with wound infections, Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Pseudomonas aeruginosa (pyocyanic bacillus) and MRSA (strain ATCC 43300). The dressing sustains antibacterial activity for up to 7 days in in vitro studies.

DIRECTIONS FOR USE

- Clean the wound using sterile saline solution.
- Choose a dressing size which ensures that the dressing will cover the entire wound.
- Remove the protective tabs from the dressing.
- Apply the dressing directly to wound.
- Cover it with a secondary dressing and hold in place using a fixing bandage.
- Change **Restore Contact Layer Silver** dressing every 1 to 3 days, depending on the wound and the healing progression.
- Duration of treatment is determined by the physician and depends on wound type and healing conditions.

WARNINGS AND PRECAUTIONS

- **Restore Contact Layer Silver** tends to stick to latex gloves. Moisten latex gloves with normal sterile saline prior to use.
- Concomitant use of other antimicrobial agent is not recommended.
- Use in pregnant or breast-feeding women and newborns has not been studied.
- Do not re-use the dressing.
- Store the dressing flat and at room temperature.

CONTRAINDICATIONS

- **Restore Contact Layer Silver** should not be used on individuals who are sensitive to silver or who have had an allergic reaction to the dressing or one of its components.

HOW SUPPLIED

Restore Contact Layer Silver is supplied in two sizes:
4" x 5" (10 cm x 12 cm) and 6" x 8" (15 cm x 20 cm)
A box contains 10 dressings.
Each dressing is individually packed in a sterile pouch.
Sterilization by radiation. Sterility is guaranteed unless a package is damaged or opened.
Single use only.

REF.: 509341: 4"x 5" (10 cm x 12 cm)
509342: 6"x 8" (15 cm x 20 cm)

Graphical Symbols
Symboles graphiques
Simbolos Gráficos

Attention: see instructions for use.
Attention: voir le mode d'emploi.
Atención: Vea las instrucciones de uso.

Single Use.
Usage unique.
No los use más de una vez.

Keep dry.
Conserver au sec.
Consérvelos secos.

USA: 1-800-323-4060
FAX Order: 847-680-1017
CANADA: 1-800-263-7400
FAX Order: 1-800-432-8846

ETATS-UNIS: 1-800-323-4060
Commande par télécopieur: 847-680-1017
CANADA: 1-800-263-7400
Commande par télécopieur: 1-800-432-8846

hollisterwoundcare and wave logo are trademarks of Hollister Incorporated
Restore, TRIACT and graphic, are trademarks of Hollister Wound Care, LLC.

hollisterwoundcare et le logo wave sont des marques de Hollister Incorporated
Restore, TRIACT et graphique, sont des marques de commerce de Hollister Wound Care, LLC.

hollisterwoundcare y el logotipo de wave son marcas registradas de Hollister Incorporated
Restore, TRIACT y el grafico, son marcas registradas de Hollister Wound Care, LLC.

www.hollisterwoundcare.com

Printed in France.
©2006 Hollister Incorporated.

hollisterwoundcare
An alliance of Hollister Incorporated and Laboratoires URGO

Distributed by:
Hollister Wound Care, LLC
Libertyville, Illinois 60048 USA

Distributed in Canada by:
Distribué au Canada par:
Hollister Limited
Aurora, Ontario L4G 1G3

419122A

Restore

TRIACT

INSTRUCTIONS/MODE D'EMPLOI/INSTRUCCIONES

Silver/Argent/Plata : 2.25 mg/sq in

Contact Layer Silver,
Non-Adherent Dressing, Antimicrobial

Interface Argent,
Pansement non-adhérent, antibactérien

Capa de contacto con Plata,
Apósito no adherente, antimicrobiano

STERILE
STÉRILE
ESTÉRIL

Rx Only

Caution: Federal laws restricts this device to sale or on the order of a physician or licensed healthcare professional

Précaution : la loi fédérale exige de ce dispositif d'être vendu sur prescription d'un professionnel de la santé ou d'un médecin assermentés

Atención: Las Leyes Federales restringen la venta de este producto bajo prescripción bien sea de un médico ó licenciado en ciencias de la salud

hollisterwoundcare
An alliance of Hollister Incorporated and Laboratoires URGO

Restore Interface Argent avec la Technologie TRIACT,

Pansement non-adhérent, antibactérien

DESCRIPTION

L'interface Argent Restore est un pansement non-adhésif, non occlusif, antibactérien, constitué d'une trame polyester imprégnée de particules hydrocolloïdes (carboxymethylcellulose), de polymères, de vaseline et d'argent (2.25 mg/ po²).

INDICATIONS

De par son mode d'action antibactérien, **l'interface argent Restore** est indiqué dans le traitement des plaies faiblement à modérément exsudatives à risque d'infection, incluant les brûlures du 2nd degré, les escarres, les ulcères veineux, les ulcères du pied diabétique, et les sites donneurs et en attente de greffes.

MODE D'ACTION

La spécificité de la technologie TRIACT réside dans la présence d'une matrice polymérique qui assure la cohésion des particules hydrocolloides et de la vaseline sur une trame polyester.

Au contact des exsudats, les particules hydrocolloides (CMC) se gélifient et forment un gel lipido-colloïde qui créé un environnement humide et favorise le processus cicatriciel.
L'interface Argent Restore est indolore au retrait et n'endommage pas les tissus néoformés. Elle est recommandée dans le traitement des plaies présentant une peau périlésionnelle fragile.

L'interface Argent Restore présente un large spectre d'action antibactérien, efficace sur les bactéries les plus fréquemment responsables de la surinfection des plaies, Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Pseudomonas Aeruginosa (bacille pyocyanique) et SARM (Staphylocoques Aureus Méti-Résistants). Le pansement a démontré une activité anti-bactérienne in vitro se poursuivant pendant 7 jours.

MODE D'EMPLOI

- Nettoyer la plaie avec du sérum physiologique.
- Choisir une taille appropriée afin que le pansement recouvre toute la plaie.
- Retirer les ailettes de protection du pansement.
- Appliquer le pansement directement sur la plaie et le recouvrir avec un pansement secondaire ou un bandage de fixation.
- Renouveler **l'interface Argent Restore** tous les 1 à 3 jours en fonction de la plaie traitée et de son évolution.
- La durée du traitement est déterminée par le prescripteur et dépend du type de plaie et des conditions de cicatrisation.

MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI

- **L'interface Argent Restore** risque d'adhérer aux gants chirurgicaux (latex et vinyl). Il est recommandé d'humidifier les gants avec du sérum physiologique avant de le manipuler.
- L'utilisation conjointe avec d'autres traitements antiseptiques locaux n'est pas recommandée.
- L'utilisation de **l'interface Argent Restore** pendant la grossesse, l'allaitement, chez le nouveau- né, n'a pas été étudiée.
- Ne pas réutiliser le pansement.
- Stocker le pansement à plat et à température ambiante.

CONTRE-INDICATIONS

- Sensibilisation connue à l'argent et/ou à d'autres composants du pansement.

PRESENTATION

L'interface Argent Restore est disponible en deux tailles :
4" x 5" (10 cm x 12 cm) et 6" x 8" (15 cm x 20 cm)
Une boîte contient 10 interfaces.
Chaque pansement est conditionné individuellement sous sachet stérile.
Stérilisation par radiation. Le contenu est stérile sauf si l'emballage est ouvert ou endommagé.
Usage unique.

REF.: 509341 : 4"x 5" (10 cm x 12 cm)
509342 : 6"x 8" (15 cm x 20 cm)

Restore Capa de contacto Plata con la tecnologia TRIACT,

Apósito no adherente, antimicrobiano

DESCRIPCIÓN

Restore capa de contacto con Plata es un apósito no adherente, antimicrobiano, no-oclusivo, compuesto por partículas de hidrocoloides (carboximetilcelulosa), de polímeros, de vaselina y de plata (2.25 mg/pulg.cuadrada) dispersadas en una red de poliéster.

INDICACIONES

Restore Capa de contacto con Plata está indicado para reducir la infección de heridas con exudación moderada ó alta, en heridas superficiales o profundas, incluso para quemaduras de segundo grado, úlceras por presión, úlceras de pierna, úlceras diabéticas, injertos y donaciones.

MODO DE ACCION

La tecnología TRIACT consiste en asociar una matriz polimérica que garantiza la cohesión de las partículas hidrocoloidales con una trama de poliéster impregnada de vaselina y de plata. Las partículas hidrocoloides (CMC), al entrar en contacto con los exudados, forma un gel y forman, gracias a la matriz, una capa de contacto con Plata que crea las condiciones favorables para el proceso de cicatrización (cicatrización en medio húmedo).

Aunque **Restore Capa de contacto con Plata** no es graso al tacto, su composición química queda grasa por lo que no se adhiere ni a la ulcera ni a sus contornos: los cambios de apósitos no son dolorosos ni traumáticos. La gran flexibilidad y comodidad de Restore Capa de contacto con Plata hace que esté especialmente indicado en el recubrimiento de úlceras de difícil localización. Está particularmente indicado para las heridas con riesgo de sobreinfección.

Restore Capa de contacto con Plata ha demostrado ser eficaz contra la bacteria que más frecuentemente se asociada a las heridas infectadas, Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Pseudomonas aeruginosa (pyocyanic bacillus) y MRSA (strain ATCC 43300). La actividad de las sustancias antibacterianas es de hasta 7 días en estudios in Vitro.

INSTRUCCIONES DE USO

- Limpiar la herida con suero fisiológico.
- Seleccionar un tamaño adaptado para que el apósito cubra toda la herida.
- Retirar las películas protectoras del apósito.
- Aplicar directamente el apósito sobre la herida en una sola capa.
- Cubrir **Restore Capa de contacto con Plata** con un apósito secundario: compresas estériles sujetas con una venda de fijación
- Los cambios se realizarán cada 1 o 3 días, en función de la herida a tratar y de su evolución.

PRECAUCIONES DE USO

- **Restore Capa de contacto con Plata** se adhiere a los guantes quirúrgicos (latex vinilo), así pues se recomienda humeceder los guantes con suero fisiológico para facilitar la manipulación.
- No se recomienda la utilización conjunta con otros antisépticos locales.
- Su uso en mujeres embarazadas y recién nacidos no está estudiado.
- No uso el apósito de nuevo.
- Conservar el apósito en posición horizontal, a temperatura ambiente.

CONTRAINDICACIONES

- Hipersensibilidad conocida a la plata y/o a otros componentes de la malla.

PRESENTACIONES

Restore Capa de contacto con Plata esta disponible en dos tamaños: 4" x 5" (10 cm x 12 cm) and 6" x 8" (15 cm x 20 cm)
Una caja contiene 10 apósitos.
Cada apósito está acondicionado individualmente en sobre estéril.
Esterilizado por radiación. La esterilidad queda garantizada salvo si el paquete está dañado o abierto.
Uso único.

REF.: 509341: 4"x 5" (10 cm x 12 cm)
509342: 6"x 8" (15 cm x 20 cm)